

FEUILLE D'EXERCICE 1

Exercice 1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} .$$

- (1) f est-elle Gâteaux-différentiable dans $(0, 0)$? Si oui, calculer la dérivée suivant un vecteur $v \in \mathbb{R}^2$.
- (2) f est-elle Fréchet-différentiable dans $(0, 0)$?
- (3) f est-elle continue dans $(0, 0)$? [Piste : utiliser l'inégalité $|xy| \leq x^2 + y^2$]

Exercice 2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^6 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} .$$

- (1) f est-elle Gâteaux-différentiable dans $(0, 0)$? Si oui, calculer la dérivée suivant un vecteur $v \in \mathbb{R}^2$.
- (2) f est-elle Fréchet-différentiable dans $(0, 0)$?
- (3) f est-elle continue dans $(0, 0)$? [Piste : considérer la restriction à la courbe $\gamma(t) = (t, t^3)$]

Exercice 3. Calculer le gradient des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes, dans tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

- (1) $f(x, y) = x + 3y^2$
- (2) $f(x, y) = \frac{4y}{x^2+1}$
- (3) $f(x, y) = e^x \sin(y)$

En plus, pour chaque fonction calculer la dérivée suivant le vecteur $v = (1, 2)$ au point $(0, 1)$.

Exercice 4. Calculer le gradient des fonctions $g_1, g_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et $g_3 : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par :

- (1) $g_1(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_n^2$
- (2) $g_2(x_1, \dots, x_n) = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$
- (3) $g_3(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}}$